




### 3. 種糸の観察結果

※光学顕微鏡の観察による

漁場名	採苗方法	状態	平均芽数	細胞数または葉長	葉体の状況	ケイソウ汚れ	備考
手樽		浮上	50以上	0.2~0.5mm	二次芽あり クビレ, 細胞欠損あり	若干	
		固定	10	0.1~0.3mm	細胞欠損あり	多い	
磯崎1		固定	13	4細胞~0.3mm	細胞欠損あり	若干	
		固定	10	0.1~0.2mm	クビレ, 細部欠損あり	多い	
磯崎2		浮上	8	8細胞~0.2mm	二次芽あり 細胞欠損あり	なし	
		固定	2	0.1~0.2mm	細胞欠損あり	若干	
羅漢島		固定	12	0.1~0.3mm	二次芽あり クビレ, 細胞欠損あり	あり	
箕輪島	野外	浮上	50以上	0.2~0.6mm	二次芽あり 異常なし	なし	10月2日張り込み 肉眼視できる
		浮上	50以上	0.2~0.5mm	二次芽あり 異常なし	なし	
浜田	陸上	浮上	50以上	0.5~1.0mm	二次芽あり チヂレあり	なし	肉眼視できる
		浮上	16	0.1~0.4mm	二次芽あり 細胞欠損あり	あり	
都島		固定	50以上	0.1~0.2mm	異常なし	多い	
二本口		固定	6	0.1~0.3mm	細胞欠損あり	あり	
桂島内湾	陸上	固定	3	0.4~2.0mm	二次芽あり 細胞欠損あり	極めて多い	
	野外	固定	3	0.5~1.5mm	クビレ, 細部欠損あり	多い	
石浜		固定	50以上	0.5~1.8mm	二次芽あり クビレ, 細胞欠損あり	多い	
野々島		固定	9	0.5~2.0mm	二次芽あり クビレ, 細胞欠損あり	極めて多い	
駒島		固定	15	0.3~1.0mm	二次芽あり クビレ, 細胞欠損あり	極めて多い	
アリューション		浮上	21	4細胞~0.1mm	異常なし	あり	
三本口	野外	固定	6	1.0~5.0mm	チヂレ, クビレあり	多い	肉眼視できる
平崎	陸上	固定	1	0.1~0.9mm	二次芽あり クビレあり	多い	

# 4. 水 温

簡易水温モニタリングシステムデータ  
水深:0.1m  
時間:13:00~14:00



# 5. 気 象

## ●週間予報 仙台管区气象台 平成24年10月9日発表


向こう一週間、気圧の谷や寒気の影響で日本海側を中心に雲が広がりやすく、期間のはじめは雨の降る日があるでしょう。期間の終わりは高気圧に覆われて晴れるところがある見込みです。

最高気温・最低気温ともに、平年並か平年より高いでしょう。

日付		10	11	12	13	14	15	16
		水	木	金	土	日	月	火
東部		晴時々曇 	曇一時雨 	晴時々曇 	晴時々曇 	晴時々曇 	晴時々曇 	晴時々曇 
降水確率(%)		10/10/10/ 20	50	20	20	20	20	20
信頼度		/	/	A	A	A	A	A
仙台	最高(°C)	21	22 (19~23)	21 (19~23)	20 (18~21)	22 (19~24)	21 (18~23)	21 (18~23)
	最低(°C)	14	15 (13~16)	14 (12~15)	12 (10~13)	12 (10~13)	13 (11~15)	12 (10~14)

仙台の平年の平均気温 最高:20.0°C、最低:12.0°C

## 6. 潮 位



仙台港の潮位は10cm程度高めに推移しています。

### 参考: 基準水深棒位置



・本通報は、水産技術総合センターのホームページ及び携帯電話でもご覧になれます。  
ホームページアドレス <http://www.pref.miyagi.jp/mtsc/>



携帯ホームページ

このQRコードを携帯電話のカメラ機能(バーコードリーダー等)で撮影することにより、ホームページアドレスを簡単に取得することができます。

次回の調査は10月12日(金)に予定しています。

問い合わせ先 TEL

水産技術総合センター: 0225-25-1032

仙台地方振興事務所水産漁港部: 022-365-0192

宮城県漁協塩釜総合支所: 022-363-1241