

記者発表資料
令和元年8月30日
環境対策課大気環境班 022-211-2665
担当：藤山，沖田
環境対策課水環境班 022-211-2666
担当：遠藤

平成30年度ダイオキシン類に係る環境調査結果について

1 調査結果の概要

「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき実施した環境中における平成30年度ダイオキシン類調査の結果をお知らせします。

調査の結果，33地点（大気5地点，公共用水域の水質12地点，底質8地点，地下水質3地点，土壌5地点）のうち，32地点では環境基準を達成していましたが，河川1地点（鶴田川（下志田橋））で環境基準を超過していました。

なお，河川の1地点で環境基準を超過した原因は，流域で過去に使用されていた水田除草剤などの農薬に不純物として含まれていたダイオキシン類が，底泥に蓄積しており，それが徐々に流出することにより水質に影響を及ぼしているものと判断されます。

表1 ダイオキシン類環境調査結果（仙台市を除く）

環境媒体	調査地点数	基準超過地点数	調査結果			※ 環境基準	
			平均値	最小値	最大値		
大気【pg-TEQ/m ³ 】	5	0	0.0053	0.0048	0.0058	0.6以下	
公共用水域 （水質） 【pg-TEQ/L】	全体	12	1	0.58	0.076	3.4	1以下
	河川	10	1	0.62	0.076	3.4	
	湖沼	2	0	0.42	0.096	0.74	
公共用水域 （底質） 【pg-TEQ/g】	全体	8	0	4.43	0.44	15	150以下
	河川	7	0	2.91	0.44	11	
	湖沼	1	0	15	15	15	
地下水質【pg-TEQ/L】	3	0	0.019	0.017	0.023	1以下	
土壌【pg-TEQ/g】	5	0	0.244	0.012	0.46	1,000以下	

※ 環境基準：人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準であり，環境省が告示している。

単位：pg(ピコグラム)；1兆分の1グラム

TEQ(毒性等量換算濃度)：異性体のうち最も毒性の強い物質を1として各異性体の毒性を換算した量。

2 今後の対応

環境基準を超過した公共用水域の1地点を含め，今後とも県内のダイオキシン類による汚染状況を把握するため，計画に基づき継続的に環境調査を実施していきます。

平成30年度環境調査結果個別表

表2 大気環境調査結果 (単位: pg-TEQ/m³)

No.	調査地点	測定結果 (平均値)	環境基準
1	栗原合同庁舎	0.0056	0.6以下
2	石巻合同庁舎	0.0054	
3	塩釜一般環境大気測定局	0.0049	
4	大河原合同庁舎	0.0058	
5	古川Ⅱ一般環境大気測定局	0.0048	

※1 測定結果は年2回(7月及び1月)の平均値である。

※2 No.2については、石巻合同庁舎の移転に伴い、平成30年度から調査地点を変更している。

表3 公共用水域(水質)環境調査結果 (単位: pg-TEQ/L)

No.	区分	調査地点		測定結果	環境基準
		水域名	地点名		
1	河川	鶴田川	下志田橋	3.4	1以下
2		迫川	西前橋	0.14	
3		定川	定川大橋	0.11	
4		高城川	明神橋	0.73	
5		砂押川	旧多賀城堰	0.28	
6		増田川	毘沙門橋	0.41	
7		五間堀川	矢ノ目橋	0.83	
8		八幡川	港橋	0.11	
9		吉田川	魚板橋	0.076	
10		斎川	江坪橋	0.084	
11	湖沼	長沼	長沼出口	0.096	
12		伊豆沼	伊豆沼出口	0.74	

※1 年1回10月に実施した結果である。

※2 表中網掛けは環境基準を超過したものの。

表4 公共用水域(底質)環境調査結果 (単位: pg-TEQ/g)

No.	区分	調査地点		測定結果	環境基準
		水域名	地点名		
1	河川	定川	定川大橋	11	150以下
2		鶴田川	下志田橋	0.7	
3		高城川	明神橋	1.2	
4		砂押川	旧多賀城堰	0.44	
5		五間堀川	矢ノ目橋	0.67	
6		増田川	毘沙門橋	5.9	
7		迫川	西前橋	0.49	
8	湖沼	伊豆沼	伊豆沼出口	15	

※ 年1回10月に実施した結果である。

表5 地下水質環境調査結果

(単位：pg-TEQ/L)

No.	調査地点	測定結果	環境基準
1	加美町下多田川	0.018	1以下
2	富谷市今泉二の沢	0.017	
3	岩沼市寺島	0.023	

※ 年1回8～9月に実施した結果である。

表6 土壌環境調査結果

(単位：pg-TEQ/g)

No.	調査地点	測定結果	環境基準
1	旧村田第五小学校グラウンド(村田町足立)	0.33	1,000以下
2	成田一丁目公園(富谷市成田)	0.28	
3	鳴子江合川河川公園(馬場地区)(大崎市鳴子温泉)	0.012	
4	栗原市瀬峰小学校(栗原市瀬峰清水山)	0.46	
5	登米市吉田運動場(登米市米山町)	0.14	

※ 年1回8～9月に実施した結果である。

(参考)


○ダイオキシン類

塩素と酸素を含む有機化学物質の一種で、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDDs)、ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDFs)、コプラナーPCBを合わせた化学物質群の総称です。

○ダイオキシン類の毒性等量(TEQ)

ダイオキシン類は、毒性の強さがそれぞれ異なっており、PCDDsのうち2と3と7と8の位置に塩素の付いたもの(2,3,7,8-TCDD(2,3,7,8四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン))がダイオキシン類の仲間の中で最も毒性が強いことが知られています。

そのため、ダイオキシン類としての全体の毒性を評価するため、最も毒性が強い2,3,7,8-TCDDの毒性を1として他のダイオキシン類の仲間の毒性の強さを換算した毒性等価係数(TEF: Toxic Equivalency Factor)が用いられます。毒性等量(TEQ: Toxic Equivalent)は、測定されたダイオキシン類の各異性体の実測濃度に、これらの毒性等価係数(TEF)を乗じた値を合計したものです。



*PCBsの中でベンゼン環が同一平面上にあって扁平な構造を有するものを「コプラナーPCB」といいます。なお、PCBsの中には、同一平面上にない構造を有するものについてもダイオキシンと似た毒性を有するものがあり、我が国では現在、これらも併せてコプラナーPCBとして整理しています(詳細は2頁の表1のとおり)。

出典：関係