

有効成分ごとに効能又は効果又は工に例示として付記することができる効能又は効果(対比表)

別紙2

別表9の2掲げる 効能又は効果	別表9に掲げる 区分及び有効成分名	付記できる効能効果										
		ウ又は工に付記できるもの								工のみに付記でき るもの		
		I欄	II欄	III欄	IV欄	V欄	VI欄	VII欄	VIII欄	IX欄	X欄	
	下 胃 痛 腸 を が 起 弱 こ く し 腹 や 痛 す や い	の 肩 不 力 調 首 の 低 腰 下 又 及 は 膝	筋 体 体 が が だ 重 る い い 、 い 、 い 、 い 、	身 身 体 体 が が だ 重 る い い 、 い 、 い 、 い 、	疲 疲 力 力 が が だ 重 る い い 、 い 、 い 、 い 、	眠 寢 れ れ が が が 浅 い い い 、 い 、 い 、 い 、	操 へ 肌 肌 の 行 が ら 不 が れ 悪 い い 肌 い 、 い の い 、 い 乾	肌 の 行 が ら 不 が れ 悪 い い 肌 い 、 い の い 、 い 乾	血 冷 不 行 が や 調 い い 肌 い 、 い の い 、 い 乾	貧 血 不 行 が や 調 い い 肌 い 、 い の い 、 い 乾	骨 食 又 欲 は 血 の 気 歯 味 の 衰 だ 低 だ 下 だ 伴 だ う さ	二 日 の 酔 低 に 下 伴 だ う さ
	I欄		○		○						○	○
	II欄				○		○					
	III欄				○		○			○		
	IV欄						○					
	V欄				○					○		
	VI欄		○					○				
	VII欄											○
	VIII欄								○			
	IX欄	1項							○			
		2項				○		○				
		3項						○				
	1項	L-イソロイシン		○	○	○						
		カルニチン塩化物				○					○	
		グリシン					○					
		L-グルタミン酸	○			○						○
		ジクロロ酢酸ジソプロピルアミン										○
		タウリン				○					○	
		L-トレオニン										○
		L-バリン		○	○	○						
		D L-メチオニン										○
		L-ロイシン		○	○	○						
	X欄	2項									○	
		3項						○			○	
		6項								○	○	
		7項						○	○			
		8項									○	
		9項		○								
		10項			○							
		炭酸マグネシウム								○		
		デヒドロコール酸								○		
		パンテチン			○		○					
	XI欄 (生葉)	アセンヤク	○									
		ウイキョウ									○	
		オウセイ			○							
		加工ダイサン(オキソアミジン)			○			○		○		
		ガラナ			○							
		カンゾウ	○									
		クコシ				○						○
		ケイヒ									○	
		コウジン				○			○		○	
		サフラン					○		○			
		サンザシ	○								○	
		サンヤク	○									
		シゴカ			○	○					○	
		シャクヤク	○					○				
		シュクシャ	○								○	
		ショウキョウ	○				○		○		○	
		タイソウ	○			○	○				○	
		チョウジ					○					
		チンビ									○	
		トウキ							○			
		トチュウ		○								
		ニクジュヨウ				○						
		ニンジン				○			○		○	
		ニンニク				○			○		○	
		ブクリョウ	○				○					
		モッコウ	○									
		ヤクチ	○									
		ヨクイニン							○			
		リュウガンニク						○				
		ローヤルゼリー					○					