

どのような症状がみられますか？

- 打った部分がへこんでいる。
- 意識がない。
- 出血が止まらない。
- けいれんがある。
- 何回も吐く。

症状がみられたものを「はい」とした場合

「はい」が1つ以上

「はい」がない

- すぐに泣かずに、泣くまで数十秒かかった。
- 顔色が悪く、吐いたり吐き気がある。
- 出血している。
- 大人の親指以上のたんこぶがある。
- プヨプヨと腫れてきた。

症状がみられたものを「はい」とした場合

「はい」が1つ以上

「はい」がない

休日夜間急患センター等を受診しましょう。

- 頭を打ってもすぐに泣き、顔色も変わらず、その後は元気がある。
 - 大人の親指ほどもない大きさのたんこぶがあるが他の症状がない。
 - たんこぶがなく、他の症状もない。
- この欄にしか「はい」がない。

様子をみながら診療時間になるのを待ってかかりつけ医の先生に診てもらってください。

ただし、症状が大きく変わったら休日夜間急患センター等を受診しましょう。



ご家庭で

- 出血があった場合は、乾いたタオルで強く圧迫しましょう。
- 体をゆすったり、たたいたりしないようにしましょう。
- ぶつけて腫れている部分があれば、冷やしてあげましょう。
- すぐに泣いて、他の症状がないときでも、安静にして数時間は注意深く様子をみましょう。

お医者さんに伝えましょう

1 原因は何ですか？

- 落ちた
- 転んだ
- ぶつけた
- その他 ()

2 落ちた場所、または転んだ場所はどこですか？

3 落ちた時は、その高さはどのくらいですか？

