


三陸沿岸の海況


< 月旬平均海流 >

- ◆長期間継続していた三陸沿岸における黒潮続流（暖水）の北偏勢力は、3月以降弱まる傾向にあり、常磐沖辺りで東側に向きを変えている。
- ◆しかし、津軽暖流が三陸沿岸沿いに南下傾向にあること、また、八戸沖に暖水塊が分布していることから、親潮分岐（冷水）の南下が阻まれる状態にある。



<月旬平均海面水温>

◆黒潮続流（暖水）が三陸沿岸から離れたものの、親潮分岐（冷水）の南下勢力が弱いこと、また、夏前から記録的な高気温が続いていることもあり、三陸沿岸の水温は前2年と同等、平年よりもかなり高い傾向にある。




月旬平均海流：気象庁HP (https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/data/db/kaikyo/jun/current_HQ.html)

<江島の表面水温の推移>

◆ 7月～9月期は、前年と同程度～やや低め、平年よりやや高め～高めで推移。

- ・ 7月期：前年比： $-1.4 \sim -0.5^{\circ}\text{C}$ ，平年比： $+0.4 \sim +1.3^{\circ}\text{C}$
- ・ 8月期：前年比： $-0.9 \sim +0.7^{\circ}\text{C}$ ，平年比： $+1.9 \sim +2.5^{\circ}\text{C}$
- ・ 9月期：前年比： $-0.3 \sim +0.9^{\circ}\text{C}$ ，平年比： $+1.8 \sim +2.5^{\circ}\text{C}$




定地水温情報：宮城県水産情報システム（宮城水産NAV I）ホームページのデータを基に作成

<https://suisan-navi.pref.miyagi.jp/>

<田代島の表面水温の推移>

- ◆ 前年と比べて、7月は不規則に変化、8～9月は低め～同等で推移。
- ◆ 平年と比べて、7月は不規則に変化、8～9月は高めで推移。
 - ・ 7月期：前年比： $-2.5 \sim +2.8^{\circ}\text{C}$ ，平年比： $+0.1 \sim +4.4^{\circ}\text{C}$
 - ・ 8月期：前年比： $-2.1 \sim -0.2^{\circ}\text{C}$ ，平年比： $+1.4 \sim +2.9^{\circ}\text{C}$
 - ・ 9月期：前年比： $-0.4 \sim +0.6^{\circ}\text{C}$ ，平年比： $+2.0 \sim +2.5^{\circ}\text{C}$



定地水温情報：宮城県水産情報システム（宮城水産NAV I）ホームページのデータを基に作成
<https://suisan-navi.pref.miyagi.jp/>