

記 者 発 表 資 料
 令 和 7 年 1 2 月 1 8 日
 環境対策課大気環境班
 担当：佐藤、新貝 022-211-2665
 環境対策課水環境班
 担当：宍戸、千葉 022-211-2666

令和6年度ダイオキシン類に係る環境調査結果について

1 調査結果の概要

「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき実施した環境中における令和6年度ダイオキシン類に係る環境調査の結果をお知らせします。

調査の結果、33地点（大気5地点、公共用水域の水質12地点、底質8地点、地下水質3地点、土壌5地点）のうち、32地点では環境基準を達成していましたが、河川1地点（鶴田川（下志田橋））で環境基準を超過していました。

なお、当該河川の1地点は、これまで継続して環境基準を超過している川であり、その原因是、流域で過去に使用されていた水田除草剤などの農薬に不純物として含まれていたダイオキシン類が、底泥に蓄積しており、それが徐々に流出することにより水質に影響を及ぼしているものと判断されます。

表1 ダイオキシン類環境調査結果（仙台市を除く）

環境媒体	調査 地点数	基 準 超 過 地 点 数	調査結果			※ 環境基準
			平均値	最小値	最大値	
大気【pg-TEQ/m ³ 】	5	0	0.012	0.0075	0.016	0.6以下
公共用水域 (水質) 【pg-TEQ/L】	全体	12	1	0.51	0.076	2.6
	河川	10	1	0.58	0.076	2.6
	湖沼	2	0	0.19	0.16	0.21
公共用水域 (底質) 【pg-TEQ/g】	全体	8	0	5.7	0.44	13
	河川	7	0	5.7	0.44	13
	湖沼	1	0	5.4	-	-
地下水質【pg-TEQ/L】	3	0	0.040	0.033	0.050	1以下
土壌【pg-TEQ/g】	5	0	0.52	0.00062	2.2	1,000以下

* 環境基準：人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準であり、環境省が告示している。

単位：pg(ピコグラム)；1兆分の1グラム

TEQ（毒性等量換算濃度）：異性体のうち最も毒性の強い物質を1として各異性体の毒性を換算した量。

2 今後の対応

環境基準を超過した公共用水域の1地点を含め、今後も県内のダイオキシン類による汚染状況を把握するため、計画に基づき継続的に環境調査を実施していきます。

令和6年度環境調査結果個別表

表2 大気環境調査結果

(単位 : pg-TEQ/m³)

No.	調査地点	測定結果 (平均値)	環境基準
1	大河原合同庁舎	0.0075	0.6 以下
2	塩竈市役所	0.010	
3	石巻合同庁舎	0.016	
4	大崎合同庁舎	0.012	
5	栗原合同庁舎	0.014	

※ 測定結果は年2回(7月及び1月)の平均値である。

表3 公共用水域(水質)環境調査結果

(単位 : pg-TEQ/L)

No.	区分	調査地点		測定結果	環境基準
		水域名	地点名		
1	河川	鶴田川	下志田橋	2.6	1 以下
2		高城川	明神橋	0.38	
3		五間堀川	矢の目橋	0.82	
4		迫川下流	西前橋	0.55	
5		砂押川	旧多賀城堰	0.54	
6		迫川中流	若柳	0.17	
7		河内沢川	新河内橋	0.25	
8		斎川	江坪橋	0.26	
9		八幡川	港橋	0.076	
10		吉田川上流	魚板橋	0.14	
11	湖沼	伊豆沼	伊豆沼出口	0.21	150 以下
12		花山ダム	ダムサイト	0.16	

※1 測定頻度は年1回で令和6年度は9月から10月に試料の採取を実施した。

※2 表中網掛けは環境基準を超過したもの。

表4 公共用水域(底質)環境調査結果

(単位 : pg-TEQ/g)

No.	区分	調査地点		測定結果	環境基準
		水域名	地点名		
1	河川	鶴田川	下志田橋	10	150 以下
2		高城川	明神橋	3.2	
3		五間堀川	矢の目橋	13	
4		迫川下流	西前橋	0.55	
5		砂押川	旧多賀城堰	12	
6		迫川中流	若柳	0.84	
7		川内沢川	新河内橋	0.44	
8	湖沼	伊豆沼	伊豆沼出口	5.4	

※ 測定頻度は年1回で令和6年度は9月から10月に試料の採取を実施した。

表5 地下水質環境調査結果

(単位 : pg-TEQ/L)

No.	調査地点	測定結果	環境基準
1	亘理郡山元町	0.033	1 以下
2	宮城郡七ヶ浜町	0.050	
3	本吉郡南三陸町	0.037	

※ 測定頻度は年1回で令和6年度は7月と9月に試料の採取を実施した。

表6 土壤環境調査結果

(単位 : pg-TEQ/g)

No.	調査地点	測定結果	環境基準
1	蔵王町立遠刈田幼稚園（蔵王町）	0.026	1,000 以下
2	南部コミュニティセンター（大和町）	2.2	
3	旧旭小学校（加美町）	0.37	
4	登米市立津山中学校（登米市）	0.022	
5	気仙沼市立唐桑中学校（気仙沼市）	0.00062	

※ 測定頻度は年1回で令和6年度は10月に試料の採取を実施した。

(参考)



○ダイオキシン類

塩素と酸素を含む有機化学物質の一種で、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDDs)、ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDFs)、コプラナーPCBを合わせた化学物質群の総称です。

○ダイオキシン類の毒性等量(TEQ)

ダイオキシン類は、毒性の強さがそれぞれ異なっており、PCDDsのうち2と3と7と8の位置に塩素の付いたもの(2、3、7、8-TCDD(2、3、7、8四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン))がダイオキシン類の仲間で最も毒性が強いことが知られています。

そのため、ダイオキシン類としての全体の毒性を評価するため、最も毒性が強い2、3、7、8-TCDDの毒性を1として他のダイオキシン類の仲間の毒性の強さを換算した毒性等価係数(TEF: Toxic Equivalency Factor)が用いられます。毒性等量(TEQ: Toxic Equivalent Quantity)は、測定されたダイオキシン類の各異性体の実測濃度に、これらの毒性等価係数(TEF)を乗じた値を合計したものです。



*PCBsの中でベンゼン環が同一平面上にあって扁平な構造を有するものを「コプラナーPCB」といいます。
なお、PCBsの中には、同一平面上にな
い構造を有するものについてもダイオ
キシンと似た毒性を有するものがあ
り、我が国では現在、これらも併せてコ
プラナーPCBとして整理しています(詳
細は2頁の表Iのとおり)。