

栗原保健所の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況

宮城県・栗原保健所(2021年第20週)

第20週: R3.5.17~R3.5.23まで

警報・注意報レベル
の基準値

※定点当たり報告数 = $\frac{\text{患者報告数}}{\text{定点医療機関の数}}$

| | 警報レベル | | 注意報レベル | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 |
|----------------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | 開始基準値 | 継続基準値 | 基準値 | 定当 | 定当 | 定当 | 定当 | 定当 | 定当 | 定当 | 定当 | 定当 | 定当 | 定当 | 定当 |
| インフルエンザ | 30 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 1 | - | 0.5 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | ↓ |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | 4 | - | 1.0 | 2.0 | 5.0 | - | 0.5 | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎 | 20 | 12 | - | 3.0 | 1.5 | - | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 5.0 | 3.0 → |
| 水痘 | 2 | 1 | 1 | - | 4.5 | - | 1.5 | 2.0 | - | 2.0 | 0.5 | - | - | 0.5 | ↓ |
| 手足口病 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 4 | 2 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | ↓ |
| ヘルパンギーナ | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RSウイルス感染症 | - | - | - | 4.5 | 6.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 ↓ |
| マイコプラズマ肺炎(小児科) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

■ 警報 : 大きな流行の発生・継続が疑われることを示します。

■ 注意報 : 流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があることを、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があることを示します。

| | | |
|------|----------------|----|
| 増加 | 50 ≤ R | ↑↑ |
| やや増加 | 20 ≤ R < 50 | ↑ |
| 横ばい | -20 < R < 20 | → |
| やや減少 | -50 < R ≤ -20 | ↓ |
| 減少 | -100 < R ≤ -50 | ↓↓ |

*R = (今週の報告数 / 過去5週報告数平均 - 1) × 100

