

嘔吐物処理の方法について



—準備物—



<0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液の作り方>

※嘔吐物処理等に使う濃い濃度の消毒液

500mlのペットボトルに、ペットボトルのキャップ2杯分のハイター等の原液を入れる

(ペットボトルのキャップ1杯=5ml)

①清掃する職員以外は外に出る



②次亜塩素酸ナトリウム溶液使用時は窓をあける



③PPE（個人防護具）を身につける




④清拭消毒用の紙を消毒液で湿らせておく



⑤廃棄用ビニール袋を広げておく



⑥拭き取り用の紙で嘔吐物を覆う



⑦嘔吐物を覆った紙に消毒液をかける




⑧覆った紙と一緒に嘔吐物を取り除く



⑨消毒液にひたした紙で清拭消毒する



⑩飛び散る範囲を考慮して広めに清拭消毒する



⑪水拭きで消毒液を拭き取る



⑫ゴミ袋をしぼる

- 中の物が飛散しないように、静かにゴミ袋の口を閉める。
- 新しいゴミ袋を用意し、最初のゴミ袋を中に入れる。
(または最初からゴミ袋を2重にしておく)

⑬手袋を外す



汚染区域に触れないように



⑭ エプロンを外す



汚染区域に触れないように丸めて捨てる



⑮ マスクを外す前に手指を
アルコール消毒する



⑯ 顔に手を触れないように外す



⑰ 廃棄物は感染性廃棄物として扱う
※汚染区域に触れないようにしぼる



⑱ 石けんと流水で手洗いする。
換気も忘れずに

