

のり漁場栄養塩情報（第4報）

宮城県のり養殖安定化対策本部

栄養塩分析の結果（のり研幹事等提供サンプル）をお知らせします。

漁場	栄養塩濃度	水温
佐須 10月2日	1.6	22.7℃
	0.3	
生草 10月2日	0.8	22.7℃
	0.2	

上段：三態窒素（ $\mu\text{g-at/L}$ ）下段：リン酸態リン（ $\mu\text{g-at/L}$ ）

生産期の栄養塩濃度の基準

- 三態窒素は、 $5\ \mu\text{g-at/L}$ 以上で色調が維持され、 $3\ \mu\text{g-at/L}$ を下回ると色落ちする傾向にあります。
- リン酸態リンは、 $0.23\sim0.45\ \mu\text{g-at/L}$ がのり養殖に最低限必要な濃度（水産用水基準）となっています。

（参考）10月1日まで発行分

漁場	9月10日	9月19日	9月24日	10月1日
東宮浜	3.8	17.7	14.2	63.0
	0.6	1.4	1.4	2.5
矢板	8.6	18.5	17.7	14.6
	1.0	1.2	1.4	1.2
浜田	10.3	17.3	12.0	12.2
	0.8	1.1	0.8	1.2
在城島	6.4	17.2	10.6	9.7
	1.0	1.1	1.0	0.9
箕輪島	6.4	17.5	9.4	8.1
	0.9	1.2	0.8	0.9
福浦島	61.1	34.7	13.4	4.9
	4.1	2.5	1.9	1.1
磯崎1	30.8	25.8	13.6	1.7
	2.3	2.6	2.4	1.3
磯崎2	46.3	35.0	10.1	4.9
	3.2	2.7	1.8	1.3
湾中央	0.6	10.7	3.5	2.2
	0.5	0.6	0.6	0.7
桂島内湾	1.2	5.1	5.2	1.5
	0.5	0.4	0.6	0.6
駒島	0.3	5.1	13.2	1.9
	0.4	0.3	1.3	0.9
アリューシャン	1.4	17.5	9.6	1.5
	0.4	1.2	0.9	0.5
平崎	2.3	14.4	12.0	10.7
	0.6	1.0	1.0	1.0
三本口	2.0	15.2	10.7	12.3
	0.5	1.0	0.9	1.0
石浜	3.1	7.2	10.6	4.9
	0.5	0.5	1.0	0.7
吉田浜（湾外）	6.3	13.8	16.2	8.7
	0.6	1.0	1.2	0.7
桂島（湾外）	0.4	11.7	10.5	8.8
	0.1	0.8	0.9	0.7
寒風沢前（湾外）	5.3	7.1	8.1	6.5
	0.6	0.5	0.7	0.7
湾内の平均	12.3	17.3	11.1	10.3
	1.2	1.3	1.2	1.1
全調査地点の平均	10.9	16.2	11.2	9.9
	1.0	1.2	1.1	1.0

次回の発行は、10月8日（水）を予定しています。

・本情報は、宮城県水産技術総合センターのホームページでも御覧になれます。

URL <https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/mtsc/>

調査機関及び問合せ先 TEL

宮城県水産技術総合センター：0225－24－0130

宮城県仙台地方振興事務所水産漁港部：022－365－0192

宮城県漁協（七ヶ浜町水産振興センター）：022－357－2543