

(2) 農薬の使用方法

○ねぎ(殺菌剤)

| FRAC<br>コード | 有効成分名                | 薬剤名          | べ<br>と<br>病 | 黒<br>斑<br>病 | 葉<br>枯<br>病 | さ<br>び<br>病 | 軟<br>腐<br>病 | 備考                                                                                                     |
|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7           | ピラジフルミド              | パレード20フロアブル  |             | ○           | ○           | ○           |             |                                                                                                        |
| 11          | アゾキシストロビン            | アミスター20フロアブル | ○           | ○           |             | ○           |             | ●使用方法「散布」のみ採用                                                                                          |
| 11          | クレソキシムメチル            | ストロビーフロアブル   |             | ○           |             | ○           |             |                                                                                                        |
| 2           | イプロジオン               | ロブラール水和剤     |             | ○           |             |             |             | ●希釈倍率使用量「1000倍」を採用<br>●黒斑病のみ採用                                                                         |
| 3           | テブコナゾール              | オンリーワンフロアブル  |             |             |             | ○           |             | ●さび病のみ採用                                                                                               |
| 3           | トリホリン                | サブロール乳剤      |             |             |             | ○           |             | ●希釈倍率使用量「800倍」を採用                                                                                      |
| 3           | ミクロブタニル              | ラリー水和剤       |             |             |             | ○           |             |                                                                                                        |
| 19          | ポリオキシシン水和剤           | ポリオキシシンAL水和剤 |             | ○           |             |             |             |                                                                                                        |
| P2          | プロベナゾール              | オリゼメート粒剤     |             |             |             |             | ○           |                                                                                                        |
| M1          | ノニルフェノールスルホン酸銅       | ヨネボン水和剤      | ○           |             |             |             | ○           | ●べと病、軟腐病のみ採用                                                                                           |
| M3, I:UN    | マンゼブ                 | ジマンダイセン水和剤   | ○           | ○           |             | ○           |             |                                                                                                        |
| M3, I:UN    | マンゼブ                 | ペンコゼブ水和剤     |             |             |             | ○           |             | ●さび病のみ採用                                                                                               |
| M3, I:UN    | マンゼブ                 | ペンコゼブフロアブル   | ○           | ○           |             | ○           |             | ●希釈倍数使用量「600倍」を採用                                                                                      |
| -           | シュードモナスロデシア          | マスタピース水和剤※   |             |             |             |             | ①           | ※野菜類(だいこん, はくさい, ブロッコリー, キャベツ, レタス, 非結球レタス, かぼちゃ, ズッキーニ, しょうが, トマト, ミニトマトを除く)での登録<br>希釈倍数使用量「1000倍」を採用 |
| 21/27       | アミスルブロム/シモキサニル       | ダイナモ顆粒水和剤    | ○           |             |             |             |             |                                                                                                        |
| 3/M3, I:UN  | シメコナゾール/マンゼブ         | テーク水和剤       | ○           | ○           |             | ○           |             | ●べと病、黒斑病、さび病のみ採用                                                                                       |
| 40/M1       | ジメトモルフ/塩基性塩化銅        | フェスティバルC水和剤  | ○           |             |             |             |             |                                                                                                        |
| 40/M3, I:UN | ベンチアパリカルブイソプロピル/マンゼブ | ベネセット水和剤     | ○           | ○           |             |             |             | ●希釈倍数使用量「750倍」を採用                                                                                      |
| 40/M5       | ジメトモルフ/TPN           | カーニバル水和剤     |             |             |             | ○           |             | ●さび病のみ採用                                                                                               |
| 40/M5       | ベンチアパリカルブイソプロピル/TPN  | プロポーズ顆粒水和剤   | ○           |             |             |             |             | ●べと病のみ採用                                                                                               |
| M7/M3, I:UN | イミノクタジンアルベシル酸塩/マンゼブ  | サーガ水和剤       |             | ○           |             | ○           |             | ●黒斑病、さび病のみ採用                                                                                           |
| 39, I:21A   | トルフェンピラド             | ハチハチ乳剤       |             |             |             | ○           |             | ●さび病のみ採用                                                                                               |
| 24/M01      | カスカマイシン/銅水和剤         | カスミンボルドー     |             |             |             |             | ○           |                                                                                                        |
| 31/24       | オキシリニック酸/カスカマイシン     | カセット水和剤      |             |             |             |             | ○           |                                                                                                        |
| 7           | インヒルブルキサム水和剤         | カナメフロアブル     |             |             |             | ○           |             | ●さび病のみ採用                                                                                               |
| U17         | ピカルブトラゾクス            | ピシロックフロアブル   | ②           |             |             |             |             | ●べと病のみ採用                                                                                               |

①野菜類(だいこん, はくさい, ブロッコリー, キャベツ, レタス, 非結球レタス, かぼちゃ, ズッキーニ, しょうが, トマト, ミニトマトを除く)での登録

②鱗茎類での登録