

(2) 農薬の使用法

○りんご(殺菌剤)

FRAC コード	有効成分名	薬剤名	赤 星 病	う ど ん こ 病	褐 斑 病	黒 星 病	黒 点 病	すす 斑 病	炭 疽 病	斑 点 落 葉 病	腐 ら ん 病	モ ニ リ ア 病	紋 羽 病	白 紋 羽 病	紫 紋 羽 病	輪 紋 病	備考
1	チオファネートメチル	トップジンMオイルペースト									○						
1	チオファネートメチル	トップジンMペースト									○						
1	チオファネートメチル	トップジンM水和剤										①		○			
1	ベノミル	ベンレート水和剤												○			
7	ピラジフルミド	パレード15フロアブル			○					○							○
7	ベンチオピラド	フルーツセイバー				○	○	○		○	○						
11	クレソキシムメチル	ストロビードライフロアブル			○		○	○	○	○							○
11	トリフロキシストロピン	フリントフロアブル25			○	○	○	○	○	○							○
11	ビリベンカルブ	ファンタジスタ顆粒水和剤			○	○	○			○							
29	フルアジナム	フロンサイドSC												○	○		
9	シプロジニル	ユニックス顆粒水和剤47		○	○					○							
6	イソプロチオラン	フジワン粒剤												○			
14	トルクロホスメチル	リゾレックス水和剤													○		
3	イミベンコナゾール	マネーヅDF	○	○		○											
3	オキスポコナゾールフマル酸塩	オーシャイン水和剤	○	○		○				○	○						
3	ジフェノコナゾール	スコア顆粒水和剤	○	○		○				○	○						
3	シメコナゾール	サンリット水和剤	○	○	○	○				○							
3	テトラコナゾール	サルバトーレME	○	○		○					○						
3	テブコナゾール	オンリーワンフロアブル		○	○	○				○	○						
3	トリフルミゾール	トリフミン水和剤	○	○		○				○							
3	フェンブコナゾール	インダーフロアブル	○	○	○	○											
												○					
3	ヘキサコナゾール	アンビルフロアブル	○	○		○				○	○						
3	マイクロブタニル	ラリー水和剤	○	○		○				○							
19	ポリオキシシンド亜鉛塩	フランカッスプレー									○						
P7	ホセチル	アリエッティ水和剤			○												
M1	塩基性硫酸銅	ICボルドー412			○					○	○						○
M1	有機銅	キノンドーフロアブル			○	○		○	○	○							○
M1	有機銅	キノンドー顆粒水和剤			○			○	○	○							○
M1	有機銅	キノンドー水和剤80			○	○		○	○	○							○
M1	有機銅	ドキリンフロアブル			○	○		○	○	○							○
M1	有機銅	パッチレート									○						
M3	チウラム	チオノックフロアブル	○		○	○	○	○	○	○							
M3	チウラム	トレノックスフロアブル	○		○	○	○	○	○	○							
M3	ブロビネブ	アントラコール顆粒水和剤			○	○		○		○							
M4	キャプタン	オーソサイド水和剤80			○	○	○	○	○	○							
M5	TPN	パスポート顆粒水和剤			○	○	○	○	○	○	○						○

○りんご（殺菌剤）

FRAC コード	有効成分名	薬剤名	赤 星 病	う ど ん こ 病	褐 斑 病	黒 星 病	黒 点 病	すす 点 病	炭 疽 病	斑 点 落 葉 病	腐 ら ん 病	モ ニ リ ア 病	紋 羽 病	白 紋 羽 病	紫 紋 羽 病	輪 紋 病	備 考
M7	イミノクタジナルベシル酸塩	ベルコートフロアブル			○	○		○		○						○	
M7	イミノクタジナルベシル酸塩	ベルコート水和剤			○			○		○						○	
M9	ジチアノン	デランフロアブル			○					○	○						
M11	フルオルイミド	ストライド顆粒水和剤			○			○	○	○		○					
11/7	ピラクロストロビン／ボスカリド	ナリアWDG			○	○	○	○	○	○						○	
M1/M1	水酸化第二銅／有機銅	キンセット水和剤 80								⑤							●葉害軽減のため、クレフノン を必ず加用する。
-	炭酸カルシウム	クレフノン（注⑤）															
M1/M5	有機銅／TPN	シトラノフロアブル														○	
M1/-	硫酸銅五水塩／生石灰	4-12式ボルドー液								○							
M3、 I:UN/3	マンゼブ／ミクロブタニル	ブローダ水和剤	○	○		○				○		○					
M4/7	キャプタン／ペンチオピラド	フルーツガードWDG			○	○				○						○	
M4/P7	キャプタン／ホセチル	アリエッティC水和剤			○	○		○	○	○						○	
M4/M1	キャプタン／有機銅	オキシラン水和剤			○	○		○	○	○						○	
M7/M4	イミノクタジナルベシル酸塩 ／キャプタン	ダイパワー水和剤			○	○	○	○	○	○						○	●使用回数は6回以内（ただし、 開花期以降散布は3回以内）
「-、 I:UN」	石灰硫黄合剤	石灰硫黄合剤									○						
M3、 I:UN	マンゼブ	ジマンダイセン水和剤			○	○		○	○	○							
M3、 I:UN	マンゼブ	ペンコゼブ水和剤			○	○			○	○							
I:8B	クロルピクリン	クロールピクリン											○				
M9/7	ジチアノン	セルカディスDフロアブル			○	○				○							

①「モニリア病（実腐れ）」での登録。

③ベルコートフロアブル、ベルコート水和剤及びダイパワー水和剤の使用回数は、6回以内（ただし、開花期以降散布は3回以内）。

④ペフラン液剤25の使用回数は、6回以内（ただし、開花期以降散布は3回以内）での登録。

⑤キンセット水和剤80は葉害軽減のため、クレフノンを必ず加用する。

（注）同名の剤であっても農業会社によっては登録内容が異なる場合があるので、使用する際は農業の容器（袋）のラベルを確認する。