



献血の種類と主要血液製剤一覧表  
(※ 宮城県内で供給している血液製剤のみ掲載)

| 献血の種類 |                      |                                                                                     |         | 製剤の種類                                                                               |                             |                | 主な用途                     | 有効期間          | 貯法                                                |                      |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 全血献血  | 200mL 献血<br>①, ③, ④へ |    | 輸血用血液製剤 | ①赤血球製剤                                                                              | 照射赤血球液                      |                | 貧血<br>手術中の輸血             | 採血後<br>28 日間  | 2～6℃                                              |                      |
|       | 照射洗浄赤血球液             |                                                                                     |         |                                                                                     | 製造後<br>48 時間                |                |                          |               |                                                   |                      |
|       | 照射解凍赤血球              |                                                                                     |         |                                                                                     | 製造後<br>4 日間                 |                |                          |               |                                                   |                      |
|       | 照射合成血液               |                                                                                     |         |                                                                                     | A B O 血液型不適合による<br>新生児溶血性疾患 | 製造後<br>48 時間   |                          |               |                                                   |                      |
|       | 400mL 献血<br>①, ③, ④へ |                                                                                     |         | ②血小板製剤                                                                              | 照射濃厚血小板                     |                | 血小板減少症<br>白血病<br>再生不良性貧血 | 採血後<br>4 日間   | 製造後<br>48 時間<br><div>採血後<br/>4 日間を<br/>超えない</div> | 20～24℃<br>振とう保管      |
|       |                      |                                                                                     |         |                                                                                     | 照射濃厚血小板 HLA                 |                |                          |               |                                                   |                      |
|       |                      |                                                                                     |         |                                                                                     | 照射洗浄血小板                     |                |                          |               |                                                   |                      |
|       |                      |                                                                                     |         |                                                                                     | 照射洗浄血小板 HLA                 |                |                          |               |                                                   |                      |
|       |                      |                                                                                     |         | ③血漿製剤                                                                               | 新鮮凍結血漿 (120, 240, 480)      |                | 重症肝障害, 大量出血              | 採血後<br>1 年間   | -20℃以下                                            |                      |
| 成分献血  | 血小板<br>成分献血<br>②, ④へ |  | ④原料血漿   |  | 血漿分画製剤                      | ⑤血液凝固因子製剤      | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子            | 血友病 A         | 国家検定<br>合格の日<br>から 2 年間                           | 10～30℃<br>以下<br>凍結禁止 |
|       | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子        |                                                                                     |         |                                                                                     |                             | 血友病 B          |                          |               |                                                   |                      |
|       | ⑥免疫グロブリン製剤           |                                                                                     |         |                                                                                     |                             | 人免疫グロブリン G     | 重症感染症<br>特発性血小板減少性紫斑病    | 10℃以下<br>凍結禁止 |                                                   |                      |
|       |                      |                                                                                     |         |                                                                                     |                             | 抗 HBs 人免疫グロブリン | B型肝炎発症予防                 |               |                                                   |                      |
|       | ⑦アルブミン製剤             |                                                                                     |         |                                                                                     |                             | 人血清アルブミン       | 大量出血時のショック状態<br>やけど      | 室温保存<br>凍結禁止  |                                                   |                      |