

令和7年度 発生予察情報	発生予報第1号（概要版）	令和7年4月 17 日発行 宮城県病虫害防除所 (TEL:022-275-8982)
-----------------	---------------------	--

品目	病虫害名	発生予報	
麦類	オオムギ赤かび病	発生時期: 平年並	発生量: 平年並
	コムギ赤かび病	発生時期: 平年並	発生量: 平年並

より詳しい内容は、下記ホームページでご確認ください。 宮城県病虫害防除所 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/byogai/ 次回、発生予報第2号の発行日は令和7年5月21日(水)の予定です。 ★宮城県病虫害防除所から『メルマガ』で 発生予察情報の発表をお知らせしています★	  宮城県病虫害防除所 メルマガ トップページ 登録フォーム
---	---

令和7年度 発生予察情報	発生予報第1号－麦類－	令和7年4月 17 日発行 宮城県病害虫防除所
-----------------	--------------------	----------------------------

－5月中旬までの発生予報と防除のポイント－

作況試験ほ:大崎市古川(古川農業試験場)

天候予報:仙台管区気象台4月 10 日発表

1 発生予報

病害虫名	発生時期	発生量
オオムギ赤かび病	平年並	平年並

予報の根拠

- (1) 向こう1か月の平均気温は高いと予報されている。(－/)
- (2) 作況試験ほにおける「大麦」の幼穂長は平年より短い、「シュンライ」、「ミノリムギ」ともに出穂期、開花期は平年並と予測されている(表1)。(±/)
- (3) 開花期前後の降雨が発生に好適であり、向こう1か月の降水量は平年並が多いと予報されている。(/±)

病害虫名	発生時期	発生量
コムギ赤かび病	平年並	平年並

予報の根拠

- (1) 向こう1か月の平均気温は高いと予報されている。(－/)
- (2) 作況試験ほにおける「小麦」の幼穂長は平年並～短い、「シラネコムギ」、「夏黄金」ともに、出穂期、開花期は平年並と予測されている(表1)。(±/)
- (3) 開花期前後の降雨が発生に好適であり、向こう1か月の降水量は平年並が多いと予報されている。(/±)

表 1 出穂期・開花期の予測

麦種	品種	幼穂長(mm)		出穂期(月/日)		開花期(月/日)	
		本年	平年	本年 見込み	平年	本年 見込み	平年
大麦	シュンライ	18.8	19.9	4/21	4/23	4/28	4/30
	ミノリムギ	13.0	16.3	4/26	4/28	5/3	5/4
小麦	シラネコムギ	5.3	5.8	5/5	5/3	5/15	5/13
	夏黄金	6.3	7.4	5/3	5/3	5/14	5/13

※ 令和6年播種(令和7年産)麦類作況試験生育状況(出穂期及び開花期の本年見込みは 4/10 現在の主茎幼穂長及び古川アメダスの平均気温の平年値を基に算出、古川農業試験場)

※ 播種日:令和6年 10 月 18 日

※ 平年値は過去7か年の最高値と最低値を除いた5か年の平均値

※ 予報の根拠 (発生時期 / 発生量)

発生時期・・・(+):遅くなる要因 (±):平年並になる要因 (－):早くなる要因 (空欄):該当せず
発生量・・・(+):多くなる要因 (±):平年並になる要因 (－):少なくなる要因 (空欄):該当せず

2 防除のポイント

- ・薬剤防除の適期は、1回目が開花始期～開花期、2回目はその7～10 日後である。生育状況をよく観察し、適期を逃さないよう防除を行う。
- ・「夏黄金」の薬剤防除は3回を基本とし、3回目は2回目の7～10 日後に実施する。
- ・「ホワイトファイバー」は「シュンライ」より出穂期が1～2日遅いので、1回目の防除のタイミングに注意する。

- ・赤かび病は開花期前後にかけて降雨が続くと発生が多くなるため、降雨が続く場合は晴れ間をぬって防除を実施する。
- ・病害虫の薬剤抵抗性の発達防止のため、RAC コードが同じ薬剤の連用を避け、計画的にローテーション散布を行う。薬剤については『宮城県農作物病害虫・雑草防除指針』を参考に選定する。

<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/noenkan/boujosisinn.html>

＜参考＞ 出穂期（出穂率 40～50%）から開花期に達するまでの日数の目安

日平均 気温(℃)	大 麦			小 麦		
	開花始	開花期	開花終期	開花始	開花期	開花終期
10	8	11	14	14	19	24
13	6	9	12	11	15	19
15	5	7	9	9	12	15
18	3	5	7	6	8	10

- ・普及に移す技術第 83 号参考資料「麦類の出穂期を基準とした開花期予測」から抜粋。
- ・大麦は「シュンライ」「ミノムギ」、小麦は「シラネコムギ」に適用

《お問い合わせ先》

宮城県病害虫防除所

〒981-0914 仙台市青葉区堤通雨宮町4-17

TEL:022-275-8982 FAX:022-276-0429

E-mail:byogai@pref.miyagi.lg.jp

★宮城県病害虫防除所から『メルマガ』で
発生予察情報の発表をお知らせしています★



宮城県病害虫防除所
トップページ



メルマガ
登録フォーム