

令和8年度生育モニタリングの生育状況（宮城県古川農業試験場）

（令和8年7月23日現在）

1 だて正夢（移植栽培）

（1）生育状況

| 品 種 名         | 播種日<br>(月/日) | 移植日<br>(月/日) | 生育状況(7月21日現在) |            |              |            |                |     |            |            |             |             | 参考   |
|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|----------------|-----|------------|------------|-------------|-------------|------|
|               |              |              | 草丈            |            | 茎数           |            | 葉色             |     | 葉数         |            | 幼穂長         |             | 出穂期  |
|               |              |              | 本年値<br>(cm)   | 平年比<br>(%) | 本年値<br>(本/㎡) | 平年比<br>(%) | 本年値<br>(SPAD値) | 平年差 | 本年値<br>(枚) | 平年差<br>(枚) | 本年値<br>(mm) | 平年差<br>(mm) | 平年   |
| だて正夢          | 4/14         | 5/11         | 83.6          | 103        | 453          | 95         | 38.6           | 2.9 | 11.9       | -0.1       | 25          | 22          | 8/3  |
| (参考)<br>ひとめぼれ | 4/14         | 5/11         | 77.5          | 98         | 602          | 101        | 38.5           | 2.9 | 11.6       | -0.2       | 33          | -13         | 7/31 |

注）稚苗、栽植密度：18.5本/m<sup>2</sup>、基肥：5.0kg/10a

7月21日現在の生育は草丈が平年比103%、茎数が平年比95%とほぼ平年並。葉色は平年より2.9ポイント高い。葉数は平年より0.1枚少ない。幼穂長は25mmと平年よりも3日程度早く推移している。

（2）栽培管理

- ・基本的な管理は「ひとめぼれ」に準じて実施する。
- ・幼穂形成期に追肥を行っていない場合は、減数分裂期に窒素成分で2kg/10a程度の追肥を行う。ただし、葉色が40以上の場合には追肥を控える。
- ・高温時は飽水管理により地温の低下と根の活性維持を図る。

2 直播栽培

（1）生育状況

1）ひとめぼれ（乾田直播） ※前年との比較

| 品 種 名 | 播 種 日 | 出芽揃日 | 生育状況(7月22日現在) |            |                            |            |                |     |            |            |       |      |     | 参考 |
|-------|-------|------|---------------|------------|----------------------------|------------|----------------|-----|------------|------------|-------|------|-----|----|
|       |       |      | 草 丈           |            | 茎 数                        |            | 葉 色            |     | 葉 数        |            | 幼穂形成期 |      | 出穂期 |    |
|       |       |      | 本年値<br>(cm)   | 前年比<br>(%) | 本年値<br>(本/m <sup>2</sup> ) | 前年比<br>(%) | 本年値<br>(SPAD値) | 前年差 | 本年値<br>(枚) | 前年差<br>(枚) | 本年値   | 前年値  | 前年  |    |
| ひとめぼれ | 4/13  | 6/1  | 73.6          | 87         | 802                        | 135        | 39.9           | 2.2 | 10.0       | -0.5       | 未     | 7/17 | 8/8 |    |

注）播種方式：グレーンドリル鎮圧、播種量：5.2kg/10a、基肥：11.0kgN/10a

2）ひとめぼれ（湛水直播） ※令和6年との比較

| 品 種 名 | 播 種 日 | 出 芽 揃 日 | 生 育 状 況 (7月23日現在) |                  |                            |                  |                |           |            |                  |           |           | 参 考      |
|-------|-------|---------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|----------|
|       |       |         | 草 丈               |                  | 茎 数                        |                  | 葉 色            |           | 葉 数        |                  | 幼 穂 形 成 期 |           | 出 穂 期    |
|       |       |         | 本年値<br>(cm)       | 令和6<br>年比<br>(%) | 本年値<br>(本/m <sup>2</sup> ) | 令和6<br>年比<br>(%) | 本年値<br>(SPAD値) | 令和6<br>年差 | 本年値<br>(枚) | 令和6<br>年差<br>(枚) | 本年値       | 令和6<br>年値 | 令和<br>6年 |
| ひとめぼれ | 5/12  | 5/28    | 67.5              | 96               | 584                        | 78               | 38.7           | 0.4       | 10.3       | 0                | 7/23      | 7/18      | 8/7      |

注）播種方式：鉄コーティング、播種量2.1kg/10a、基肥：5.0kgN/10a

乾田直播の7月22日現在の生育は草丈が前年比87%、茎数が前年比135%、葉色は前年より2.2ポイント高い。葉数は前年より0.5枚少なく、生育ステージは前年より4日程度遅れている。

湛水直播の7月23日現在の生育は草丈が令和6年比96%、茎数が令和6年比78%、葉色は令和6年より0.4ポイント高い。葉数は令和6年と同程度、幼穂形成期は7月23日で生育ステージは令和6年より5日程度遅れている。

（2）栽培管理

- ・いもち病防除を実施していないほ場では、出穂前に防除を実施する。
- ・紋枯病の多発が予想される場合は、薬剤防除を実施する。
- ・イネツトムシ（イチモンジセセリ）は、7月下旬から8月上旬に発生しやすいので、ほ場内を見回り発生が多い場合には防除を実施する。
- ・斑点米カメムシ類は、穂揃期とその7～10日後の2回防除を基本とする。

<次回：令和8年8月中旬更新予定>