



宮城県

脳卒中は こんな病気




TUH
東北大学病院

脳出血

脳内の血管が破れて
出血する

くも膜下 出血

脳動脈瘤の破裂により
出血する



脳梗塞

血管が詰まる

- 宮城県では死因の**第4位**^{*}で、約**11.6人に1人**が**脳卒中**で亡くなっている
- 65歳以上の寝たきりの主な原因となっている

※出典：令和4年度人口動態統計（厚生省）

脳卒中は**突然**起こります

気づいたら**一刻も早く救急車**を呼びましょう！



顔

顔の片側が
下がり
ゆがみが
ある。



腕

片腕に力が
入らない。
手足がしびれる。



言葉

言葉が出てこない。
口がもつれて
るれつがまわらない。



体

足が思うよう
に動かない。
歩けない。



頭

経験した事
のない
激しい頭痛
がする。



目

片方の目が見えない
物が2つに見える。
視野の半分が欠ける。



早期の治療開始が死亡や重い後遺症を防ぎます。

生活習慣の見直しが 予防につながります



宮城県の各状況

減塩

1日当たりの食塩摂取量は**男性7.5g未満、女性6.5g未満**※を目指して、調味料はかけすぎない、ラーメンのスープは残す等を心掛けましょう。

※ 出典：第3次みやぎ21健康プラン



全国ワースト **1位**

20歳以上男性摂取量

11.9g※

※ 出典：平成28年
国民健康・栄養調査

肥満 解消

バランスの良い食事を心がけ、体重は毎日測って管理しましょう。

※ メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のうちいずれか2つ以上を併せ持った状態です



全国ワースト **2位**

メタボリックシンドローム
該当者・予備群割合

32.2%

※ 出典：令和3年度特定健康診査・
特定保健指導等に関するデータ

運動

右記の歩数を目標に、外出時はなるべく車やエレベーターを使わず歩く等、日頃から歩きましょう。

※ 出典：第3次みやぎ21健康プラン

	男女同じ
20～64歳	8,000歩以上
65歳以上	6,000歩以上

全国ワースト **7位**

20歳以上男性歩数

6,803歩/日

※ 出典：平成28年
国民健康・栄養調査

禁煙

喫煙は血圧を上昇させるため、禁煙しましょう。
禁煙外来や禁煙支援薬局などのサポートを受けることもお勧めです。



男女総数

全国ワースト **6位**

喫煙率

男性 **28.8%**

女性 **8.4%**

※ 出典：令和4年
国民生活基礎調査

節酒

飲みすぎは血圧を上昇させるため、**適量**を心掛け、週2日は休肝日にしましょう。



困ったときはかかりつけ医に相談を！

脳卒中・心臓病相談窓口もご利用ください



センターでは療養やリハビリに関する情報提供や、治療に関する一般的な情報提供を行っています

詳細は脳卒中・
心臓病等総合
支援センター
ホームページへ



脳卒中・心臓病相談窓口：東北大学病院 地域医療連携センター内
TEL：022-717-8735（平日8：30～16：00受付）
Email：scd-support@hosp.tohoku.ac.jp