

仙台麦作情報

2019・05・15 令和元年産麦作 第4号
宮城県仙台農業改良普及センター
Tel 022-275-8410 Fax 022-275-0296
<http://www.pref.miyagi.jp/site/sdnk/>

○大麦生育状況

- ・JAあさひな管内の11月2日播種の生育調査ほでは、出穂期は4/25。
- ・JA仙台管内の10月下旬～11月上旬播種のほ場では、出穂期は4/15～4/17。

市町村	品種	播種日	出穂期
[生育調査ほ]大和町	ホワイトファイバー	11/2	4/25
仙台市	ホワイトファイバー	10/25	4/17
仙台市	シュンライ	11/8	4/16



仙台市若林区シュンライ(5/10現在 出穂後24日)



仙台市若林区ホワイトファイバー(5/10現在 出穂後23日)

○刈り取り適期(出穂後43～48日頃目安)チェックリスト

- 茎葉が完全に黄化した
- 穂の熟色は黄色から褐色
- 子実の水分率が30%を下回った(穂首が曲がり始めた頃を目安に確認する)
- 粒の硬さが「ロウ程度」

市町村	品種	出穂期	収穫適期(出穂後43～48日で算出)
大和町	ホワイトファイバー	4/25	6/2～6/7
仙台市	ホワイトファイバー	4/17	5/30～6/4
仙台市	シュンライ	4/16	5/29～6/3

○注意事項

- 1 適期を逃さぬよう、機械収穫に支障がないようにほ場の排水改善を徹底しましょう。
 - 2 刈り遅れると「収穫ロス」と「穂発芽、硬質麦」が発生しやすくなります。
- ※穂発芽性については、「シュンライ」が「易」(生じやすい)、「ホワイトファイバー」が「中」(やや生じやすい)ですので、刈り遅れは特に気をつけましょう。
- 3 逆に刈り取りが早すぎると「未熟粒、空洞麦」が発生しやすくなります。