

令和7年産 麦作情報 第4号

宮城県亘理農業改良普及センター

令和7年5月29日発行

電話0223(34)1141 FAX0223(34)1143

ホームページ<https://www.pref.miyagi.jp/site/wrnk/>

1 成熟期の目安（出穂期から40～45日後）

地区名	品種	播種時期		成熟期調査（5月26日）				出穂期	成熟期 （穂水分40％）
				稈長 (cm)	穂長 (cm)	穂数 (本/㎡)	穂水分 (%)		
名取市 本郷	シュンライ	11月2日 条播	本年値	85.4	4.0	557	50.6	4月21日	6月3日 頃
			平年比	98%	95%	118%	－		
名取市 下増田	シュンライ	10月23日 散播	本年値	96.8	4.0	1,024	52.1	4月21日	6月4日 頃
			平年比	105%	94%	152%	－		
平均			本年値	91.1	4.0	790.5	51.4	4月21日	6月4日 頃
			平年比	102%	94%	138%	－		

- ・成熟期調査（5月26日）からも間もなく成熟期（穂水分40%）になります。刈り取り準備を進めましょう。

<参考> シュンライ品種特性表

採用年	出穂期	成熟期	稈長(cm)	穂長(cm)	穂数(本/㎡)	収量(kg/10a)
平成3年	4月29日	6月11日	83	3.8	493	483

※古川農業試験場奨励品種決定調査 平成14～16年の平均値

2 大麦の刈取適期の目安（成熟期から4～5日後）

大麦の刈取の目安

成熟期（出穂期から40～45日後）

- ・子実水分約40%
- ・穂の外観は、穂の基部のみに若干緑色が残る程度に黄化。
- ・指で押さえて乳汁がでない、ロウの硬さ。

4～5日



刈取り適期（成熟期から4～5日後）

- ・子実水分20～30%
- ・穂の外観は、全て緑色が抜け、穂首が黄色くなる。
- ・穂首の湾曲が散見される。（ほ場の3割程度）
- ・粒が硬くなり、爪で傷がつく。



5日～

刈遅れ（刈取り適期から5日以上後）

- ・子実水分20%未満
- ・穂の外観は、全体的に白っぽくなる。
- ・穂の湾曲が目立つ。（ほ場全体）
- ・粒は硬くなり、爪では傷がつかない。

3 大麦の調製の目安

- ・子実水分は、大麦 13.0%以下に仕上げましょう。
- ・篩い目は、大麦 2.4mmを基本としてください。

令和7年度宮城県農業危害防止運動実施中（実施期間 6月1日～8月31日）