令和7年産

大豆情報（Vol.2）

令和7年9月9日
宮城県石巻農業改良普及センター
Tel ： 0225-95-7612
Fax ： 0225-95-2999

技術情報はこちらのQRコードからもご覧いただけます！

今後のポイント：病害虫・雑草防除、排水対策の再点検、収穫機械・乾燥施設の点検・整備

5～8月の気象経過と一か月予報



※平年値は前5か年平均

◆8月：高温多照傾向が続く

・平均気温は平年より＋1.0℃高くなりました。

・日照時間は平年比 106 %とやや高くなりました。

・降水量は平年比 99 %と平年並になりました。

◆向こう1か月予報（9／6 ～ 10／5）

仙台管区気象台9月4日発表

1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率（%）

	低い（少ない）	平年並	高い（多い）
【気　温】	10	10	80
【降 水 量】	40	40	20
【日照時間】	20	30	50

週別気温経過の各階級の確率（%）

	低い	平年並	高い
1週目	10	10	80
2週目	10	20	70
3～4週目	10	20	70

1週目：9/6～12、2週目：9/13～19

3～4週目：9/20～10/3

生育調査（9月2日）結果

表1　9月2日生育調査

品種（作型）	地点名（旧市町）	播種日（月日）			開花期（月日）			主茎長（ｃｍ）			主茎節数（節/本）			分枝数（本/本）		
		本年	前年差	平年差	本年	前年差	平年差	本年	前年差	平年差	本年	前年差	平年差	本年	前年差	平年差
タンレイ（普通）	須江（河南）	6/16	+5	-	7/28	-1	-	65.6	-14.0	-	16.1	+1.3	-	2.5	-0.1	-
すずみのり（普通）	蛇田（石巻）	6/07	+13	-5	7/25	+5	-6	53.5	-14.3	-4.4	12.9	+0.0	-0.7	2.0	-1.3	-1.3
ミヤギシロメ（普通）	小船越（河北）	6/17	-2	+9	8/05	-3	+0	77.7	+1.9	-6.4	16.3	+1.2	+0.7	4.8	+0.8	+1.0
ミヤギシロメ（麦あと）	大曲（矢本）	7/02	+12	+18	8/07	-1	-2	93.7	+10.7	+5.3	16.3	+0.4	+0.7	2.6	-0.9	-1.0

※1　平年差・比 ： R2～R6の5か年平均（平年値）との差
※2　「-」は早い、短い、少ない、「+」は遅い、長い、多いを示す
※3　すずみのりは、R7より調査開始のため、前年・平年値はR6までの蛇田タチナガハの値を使用
※4　タンレイは、R6より調査開始のため、前年値のみ
※5　大曲ミヤギシロメは、R6より調査開始のため、前年・平年差はR5年までの河北・桃生ミヤギシロメの平均を使用

◆ 主茎長は、タンレイは前年を下回り、ミヤギシロメでは矢本では平年を上回りましたが、乾燥の影響を受けた河北では平年より短くなりました。すずみのりは、前年までのタチナガハよりも短くなりました。

◆ 主茎節数は、タンレイでは平年を上回り、ミヤギシロメでは概ね平年並み、すずみのりは前年までのタチナガハ並みとなりました。

◆ 分枝数は、河北ミヤギシロメで平年を上回り、タンレイは前年並み、それ以外では平年を下回りました。

今後の管理

◆ 排水対策

◎ 落水口や明きょの点検・整備をするとともに、大雨が予想される場合には、畝間の水を効率的に排出するために、枕地の畝を切って明きょ・落水口につなげましょう。

◆ 雑草対策

◎ ９月以降多くの雑草が種子をつけ始めるため、イヌホオズキやアレチウリなどの難防除雑草の多いほ場では、早めに除草を行いましょう。

◎ タデ類やアメリカセンダングサ、シロザ、イヌホオズキなどの大型雑草は、コンバイン収穫時に汚粒の原因となります。雑草が種子を作らないうちに手取り除草を行いましょう。

◎ 大豆落葉終期～収穫１４日前までは「つり下げノズル」や「万能散布バー」を利用した非選択性除草剤による雑草茎葉散布（大豆の茎葉・莢に直接かけないように散布する方法）が可能です。大型雑草は茎や果実の水分が低下しにくく、汚粒の原因となる場合があるので、手取り除草を行いましょう。

タデ類

シロザ

イヌホオズキ

◎ほ場に落ちた種子は湛水（水田）状態でも3年以上は生存するので 、ブロックローテーションによる田畑輪換での減少は望めません。種子をつけた雑草は、ほ場外に搬出しましょう。

◎アレチウリや帰化アサガオ類などのつる性雑草が畑に侵入しているほ場が確認されています。減収や収穫作業に重大な障害を及ぼす可能性があります。雑草が種子を作らないうちに手取り除草を行いましょう。有効な土壌処理剤の利用や体系処理による防除が有効です。

ダイズ畑に侵入している帰化アサガオ類

宮城県「普及に移す技術」第99号
トリフルラリン乳剤の大豆播種前全面土壌混和による帰化アサガオ類の初期防除効果の向上