

誰にでも  
できる！

感染性胃腸炎流行時の

# おう吐物の処理方法

## 【普段からセットしておきましょう！】

処理専用バケツ、大きいビニール袋2枚、ペーパータオル1束、使い捨て手袋（2組）、使い捨てマスク、使い捨てエプロン、使い捨て布雑巾、次亜塩素酸ナトリウム溶液、ペットボトル500mlを2～3本（1000ml～1500ml分）

## 【毎日の準備】 \*希釈した溶液は、その日のうちに使い切ってください（トイレ掃除用に使う等）

次亜塩素酸ナトリウム溶液を0.1%に希釈しておく（500mlペットボトルに水500ml + 5%の原液キャップ2杯）

### <具体的な手順>

#### ①嘔吐者の発生！！

- ・嘔吐者の看護をします（マスクを着用）
- ・周囲の人は嘔吐した場所から離れるようにし、汚染された所を次亜塩素酸ナトリウム溶液0.1%で消毒し（衣類、足の裏など）、手洗いをします。



落ち着いて対応を！



#### ③嘔吐物を速やかに取り除く


- ・ビニール袋（1枚目）の口を開けておきます。
- ・ペーパータオルで半径2mの範囲を外側から中央に向けて一方向に集め、取り除きます。



#### ④ビニール袋を密封する

- ・拭き取った時に使用したペーパータオル、手袋を入れます。
- ・次亜塩素酸ナトリウム溶液0.1%を入れ、染み込ませてから口を縛ります。


0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液



#### ⑤汚染された床を消毒する

- ・手袋を付けて嘔吐物やしぶきが飛んでいる場所半径2m範囲を広くペーパータオルで覆います。
- ・その上から次亜塩素酸ナトリウム溶液0.1%を静かに注ぎ、10分置きます。

半径2m  
以上



#### ⑥床の拭き取り

- ・床を消毒したペーパータオルを取り除きます。
- ・使い捨て布雑巾で水拭きします。
- ・靴の裏を次亜塩素酸ナトリウム溶液0.1%を染み込ませた雑巾等で消毒します。



#### ⑦後片付け

- ・④で密封したビニール袋、ペーパータオルや雑巾、装着していたエプロン・手袋・マスクを汚染面に触れないように脱ぎ、ビニール袋（2枚目）に入れて口を縛ります。

後片付けも  
しっかりと！



#### ⑧手洗い、健康観察

- ・処理後は石けんで丁寧に手を洗います。
- ・処理した人や周囲の人は、48時間は吐き気や下痢等の体調不良に気をつけましょう。

