

気仙沼湾・唐桑半島東部海域貝毒プランクトン調査結果




表: 今回(7月10日)の調査結果

| 調査地点 | 水深 | 水温 (°C) | 塩分 | 貝毒プランクトン出現数(cells/L) | | | | 備考 |
|------|-----|------------|----|----------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| | | | | Alexandrium spp. | Dinophysis | | | |
| | | | | | D. fortii | D. acuminata | その他のDinophysis | |
| ①港町 | 0m | - | - | - | - | - | - | 9日通報済み |
| | 5m | - | - | - | - | - | - | |
| ②母体田 | 0m | - | - | - | - | - | - | 9日通報済み |
| | 5m | - | - | - | - | - | - | |
| | 10m | - | - | - | - | - | - | |
| ③ニツ根 | 0m | - | - | - | - | - | - | 9日通報済み |
| | 5m | - | - | - | - | - | - | |
| ④岩井崎 | 0m | - | - | - | - | - | - | 9日通報済み |
| | 5m | - | - | - | - | - | - | |
| | 10m | - | - | - | - | - | - | |
| ⑤滝浜 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 30 | D. mitra |
| ⑥大沢 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 20 | D. caudata |

※Alexandrium spp.はまひ性貝毒、D. fortiiとD. acuminataは下痢性貝毒の原因プランクトンです。

※プランクトン出現数は水深0~10 m(①と③は底つき)の柱状採水のデータです。

※次回の調査は7月17日に実施予定です。