

『百日咳から子どもを守るために』

2回シリーズその②



どんな病気ですか？

初めはかぜの様の症状から次第に咳が増え、激しく発作性に咳き込むようになり、このような状態が長期間続きます。「ヒュー」という笛を吹くような音が聞こえる咳が特徴です。

咳き込んで吐くこともあります。生後3か月未満の赤ちゃんでは、息が出来なくなり、ひどい場合は死亡することもあります。重症化することもある子供の感染症（感染力がとても強く（麻疹と同程度）で、乳児は特に注意が必要です。

<参考>宮城県保健環境センター（宮城県結核・感染症情報センター）ホームページ

<http://www.pref.miyagi.jp/site/hokans/kansen-center.html>

| | 宮城県 | 全国 |
|----------------|-----|---------|
| 2018年 | 34名 | 11,190名 |
| 2019年（5月29日時点） | 45名 | 6,247名 |

原因は？

百日咳菌という特殊な細菌の感染で起きます。患者の飛沫や接触で容易に感染します。一度感染したら、次はかからない終生免疫の感染症ではないため、風邪のように何度でも百日咳にかかる可能性があります。

予防法は？

ワクチン接種が有効で、感染しても軽い症状ですみますが、家族等から乳児への感染例も報告されていますので、予防接種を含めた予防対策が大切です。

ワクチンはいつ、何回接種しますか？

乳幼児期に DPT(三種混合ワクチン：ジフテリア・百日咳・破傷風) または DPT-IPV(四種混合ワクチン：ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオ) を接種します。

四種混合ワクチンの場合 計4回接種します。



ご存じですか？出席停止期間（学校保健安全法）

特有の咳が消失するまで、又は5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまでです。

<参考>

- ・百日咳とは（国立感染症研究所） <https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ha/pertussis.html>
IDWR 速報データ 2019年第21週
- ・こどもとおとなのワクチンサイト https://www.vaccine4all.jp/topics_1-detail.php?tid=45